

Cuidados neonatais

Texto: Dr^a Magda Águas



CALOR

É a condição primária para o bem-estar dos cachorros recém-nascidos.

Na altura do nascimento, os cachorros são incapazes de regular a sua própria temperatura corporal. A sua temperatura interna é 3°C mais baixa do que aquela observada às 5 semanas de idade (35,5° e 38,5° respectivamente).

São muito sensíveis ao frio - quando lhes falta o calor, os seus movimentos tornam-se mais lentos e ficam impossibilitados de mamar. Desta forma, quando um cachorro fica demasiado frio deve ser gradualmente aquecido.

É necessário que a sua cama seja mantida à temperatura de, pelo menos, 28 a 30°C durante a primeira semana (a temperatura

deve ser verificada colocando um termómetro dentro da caixa que alberga os cachorros). A progenitora pode não suportar estas temperaturas: é comum sair periodicamente ou andar para se arrefecer.

ÁGUA

Um cachorro recém-nascido é constituído por 80% de água. Uma vez que a sua pele



ainda não tem a camada córnea, poderá desidratar rapidamente.

Quando um cachorro está a desidratar, perde peso. É normal um cachorro perder peso nas primeiras 24h de vida, mas esta perda é depois facilmente recuperada. Se a perda de peso inicial ultrapassar os 10% do peso corporal, deve-se administrar num biberão água morna com açúcar.

ENERGIA

Nos primeiros dias de vida, a energia é fornecida pelo colostro e depois pelo leite. Assim que nascem, os cachorros procuram espontaneamente as tetas da mãe. Caso não o façam, uma preocupação importante consiste em dirigir cada recém-nascido para um mamilo, obrigando o cachorro a ingerir o primeiro leite (colostro) que contém anticorpos. Os anti-

corpos fornecem ao cachorro uma imunidade dita passiva, por oposição à imunidade activa obtida pela vacinação. Este é um procedimento muito importante, pois os anticorpos apenas atravessam a barreira

intestinal nas primeiras horas (máximo 24) após o nascimento. Por este motivo, não se deve retirar os cachorros da mãe logo que nascem mas, pelo contrário, > deixá-los mamar imediatamente. Os

Quais são as melhores formas de aquecer um cachorro recém-nascido?

A maneira mais rápida e fácil de aquecer um recém-nascido que sofre de hipotermia é segurá-lo contra o corpo humano debaixo da roupa. As lâmpadas de infra-vermelhos são o melhor meio de prevenir a hipotermia, uma vez que mantêm o ambiente quente. Cobertores eléctricos ou sacos-de-água-quente podem também ser usados, apesar de existir um elevado risco de queimaduras ou de temperaturas mal controladas. Qualquer que seja o método escolhido, as técnicas de aquecimento externo estão indicadas quando há uma ligeira descida da temperatura. Quando não se tem experiência nesta área, o Médico Veterinário deve ser chamado com urgência para dar assistência aos cachorros ou à progenitora.





> cachorros privados de colostro são evidentemente mais vulneráveis às infecções no período neonatal. Alguns dias mais tarde a secreção láctea da mãe cobrirá todas as necessidades dos cachorros até ao início do desmame.

ALEITAMENTO NATURAL

Durante as primeiras 36 horas de vida, os cachorros devem mamar o primeiro leite ou colostro. Este, é rico em proteínas, energia e anticorpos e protege o cachorro contra as doenças. Uma das causas do choro intenso dos cachorros durante o dia é a fome. De facto, os recém-nascidos podem não estar a mamar o leite suficiente. É por esta razão que se recomenda a pesagem diária dos cachorros. Se o ganho de peso for insuficiente ou se a mãe tiver uma ninhada numerosa, não se deve hesitar em complementar a dose diária com um suplemento de leite adaptado à espécie canina.

INSUFICIÊNCIA DE LEITE

A ausência de leite (agalactia) é rara nas cadelas. No entanto, a produção de leite pode ser insuficiente se a cadela for submetida a uma cesariana antes do final do

tempo de gestação ou se as mamas se apresentarem muito congestionadas. Se a cadela não produz nenhum leite, isto é conhecido por agalactia. Em ambos os casos, um suplemento ou um substituto do leite materno é essencial. Se verificarmos

que os cachorros são incapazes de mamar porque as mamas estão muito duras (especialmente as posteriores ou inguinais), é possível tentar desbloqueá-las. As mamas devem ser massajadas com as mãos limpas, tentando tirar tanto leite quanto possível, a fim de as esvaziar e torná-las mais macias. Isto faz com que seja mais fácil para os cachorros mamar.

ALEITAMENTO ARTIFICIAL

Caso seja necessário o fornecimento de suplemento ou substituto do leite materno, deve ser seleccionado um leite adaptado à espécie canina e utilizar, de preferência, água engarrafada para a sua preparação. O leite deve ser preparado imediatamente antes da sua administração e não deve ser guardado por mais de algumas horas, no frigorífico. Se os cachorros conseguirem mamar correctamente, o biberão é a melhor solução. A entubação é um processo muito técnico e é necessário evitar que a sonda atinja os pulmões uma vez que isto pode provocar uma pneumonia por aspiração. A alimentação por sonda apenas deve ser realizado por um Médico Veterinário ou por um criador experiente.

Se os cachorros forem órfãos, deve-se imitar o comportamento materno, estimulando a área perineal dos cachorros com um pano quente humedecido durante 3 semanas a fim de os encorajar a urinar e defecar. 🐾

